

CÂNCER COLORRETAL

LIGA ACADÊMICA DE ONCOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA

EPIDEMIOLOGIA



É o terceiro câncer mais comumente diagnosticado em homens e o segundo em mulheres.

ESTATÍSTICA BRASILEIRA



Risco estimado de 19,63 casos novos a cada 100 mil homens e 19,03 casos novos para cada 100 mil mulheres.

SINAIS E SINTOMAS



A maioria dos pacientes em estágio inicial não apresentam sintomas, mas hematoquezia, melena, dor abdominal e anemia são sintomas encontrados.

DIAGNÓSTICO



Colonoscopia é o exame para diagnóstico, pois pode localizar e biopsiar lesões em todo o intestino grosso.

RASTREAMENTO



Colonoscopia de rastreamento deve ser iniciada aos 45 anos em indivíduos sem histórico familiar, já aqueles com histórico deve ser iniciado aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do parente mais novo que teve este tumor.

Referência

BARROSO-SOUSA, Romualdo; FERNANDES, Gustavo. Oncologia: princípios e prática clínica. Santana de Parnaíba - SP: Editora Manole, 2023. E-book. ISBN 9788520462638. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520462638/>. Acesso em: 25 de agosto de 2023.